

## Schwerpunkt Psychiatrie:

### Von der Euphorie zur Ernüchterung Neuroleptika in der Psychiatrie

Roswitha Hurtz und Jann E. Schlimme

#### Literatur zum Artikel:

Aderhold V (2014): Neuroleptika minimal – warum und wie.  
[www.dgsp-ev.de/fileadmin/dgsp/pdfs/Wissenschaftliche\\_Artikel/Aderhold\\_Neuroleptika\\_minimal\\_12-2014.-Januar.pdf](http://www.dgsp-ev.de/fileadmin/dgsp/pdfs/Wissenschaftliche_Artikel/Aderhold_Neuroleptika_minimal_12-2014.-Januar.pdf)

Lehmann P (2013): Psychopharmaka absetzen – Erfolgreiches Absetzen von Neuroleptika, Antidepressiva, Phasenprophylaktika, Ritalin und Tranquilizern. 4. Aufl. Antipsychiatrie-Verlag, Berlin.

Memorandum der DGSP zur Anwendung von Neuroleptika.  
[www.dgsp-ev.de/fileadmin/dgsp/pdfs/Flyer\\_Infoblatt\\_KuFo-Programme\\_Broschueren/Broschuere\\_Neuroleptika\\_2012\\_web.pdf](http://www.dgsp-ev.de/fileadmin/dgsp/pdfs/Flyer_Infoblatt_KuFo-Programme_Broschueren/Broschuere_Neuroleptika_2012_web.pdf)

DGSP-Broschüre: Neuroleptika Reduzieren und Absetzen.  
[www.dgsp-ev.de/fileadmin/dgsp/pdfs/Flyer\\_Infoblatt\\_KuFo-Programme\\_Broschueren/ReduktionNeuroleptika\\_2014\\_web.pdf](http://www.dgsp-ev.de/fileadmin/dgsp/pdfs/Flyer_Infoblatt_KuFo-Programme_Broschueren/ReduktionNeuroleptika_2014_web.pdf)

Bola JR, Lehtinen K, Cullberg J, Ciompi L: Psychosocial treatment, antipsychotic postponement, and low-dose medication strategies in first-episode psychosis: a review of the literature.

In: *Psychosis* (2009), Nr. 1, S. 4–18.

Chouinard G, Jones BD: Neuroleptic-induced supersensitivity psychosis.

In: *JAMA Psychiatry* 137 (1980), Nr. 1, S. 16-21.

Davis KL, Rosenberg, GS (1979) Is there a limbic system equivalent of tardive dyskinesia?

In: *Biol Psychiatry* 14, Nr. 4, S. 699-703.

Harrow M, Jobe TH, Faull RN: Do all schizophrenia patients need antipsychotic treatment continuously throughout their lifetime? A 20-year longitudinal study.

In: *Psychol Med* 42 (2012), Nr. 10, S. 2145-55.

Seikkula J, Alakare B, Aaltonen J: The comprehensive open-dialogue approach in Western Lapland: II. Long-term stability of acute psychosis outcomes in advanced community care.

In: *Psychosis* (2011), Nr. 3, S. 192–204.

Wunderink L, Nieboer RM, Wiersma D, Sytema S, Nienhuis FJ: Recovery in remitted first-episode psychosis at 7 years of follow-up of an early dose reduction/discontinuation or maintenance treatment strategy: long-term follow-up of a 2-year randomized clinical trial. In: *JAMA Psychiatry* 70 (2013), Nr. 9: 913-20.